



## Obavjestenje Hypospadie

### ABTEILUNG FÜR KINDERCHIRURGIE

(Leiter: Univ.-Prof. Ernst Horcher)  
Medizinische Universität Wien  
Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien  
Währinger Gürtel 18-20  
1090 Wien

Dragi roditelji

Vas sin ima Hypospadie. Hypospadie je jedna urođjena mana mokracne cijevi pri kojoj se. Otvor mokracne cijevi ne nalazi na pravom mjestu. Vas dječiji doktor/doktorica vam je sigurno objasnio/la da se možda mora operisati. Ovdje je mali vodič, kako mi dječiji hirurzi u AKH liječimo hypospadie. Vi možete računati otprilike sa jednom sedmicom boravka u bolnici. Jedan roditelj u svakom slučaju može da ostane uz sina. Mi se trudimo da boravak, operacija i liječenje budu što lakše za vaše dijete. Ukoliko imate još nekih pitanja, molimo vas nazovite na tel. 01-40400-6810 ili na e-meil: ernst.horcher@meduniwien.ac.at

- Dob djeteta kod korekture hypospadie je od 6 mjeseca zivota
- Hormonalno predliječenje samo u pojedinim slučajevima i poslije dogovora
- Nacin izvodjenja je Operacija po SNODGRASS. Mi se trudimo da hypospadie sa jednom operacijom izliječimo. Ukoliko penis slučajno bude kriv, to će biti odmah ispravljeno
- Prijem je dan prije operacije, na odjeljenju dječije hirurgije Station 17E u zelenom pojasu AKH (grüner Bettenturm). Tu će se istovremeno izvršiti pregled i bit će opširno obavijesteni o načinu operacije, narkozi kao i daljem liječenju
- Kod jednostavnih slučajeva hypospadie ne vrši se nikakva dalja dijagnostika. Kod težih slučajeva vrše se dodatni pregledi (hormoni, ultrazvuk i ostalo) u dogovoru sa pedijatrom
- Radi se u dječijoj narkozi koju izvode specialisti za dječju narkozu
- Upotrebljava se lupa i mikrohirurški instrumenti
- Suprapubicni odvod mokrace (kateter trbusnog zida) ukoliko je potrebno
- U zavisnosti od operacije stavlja se uretralna sina (plasticna cijev u penisu) u trajanju od 5-7 dana, sve dok rana ne zacijeli.
- Stavlja se laki kruzni zavoj na penis
- Suprapubise mokrenje 1 dan duže od uretralne sine
- Otpuštanje poslije uspješnog mokrenja
- Ambulantna kontrola poslije 1 i 6 sedmice kao i poslije 6 mjeseci